

***Тема: Частота распространения
устойчивых к карбапенемам
штаммов грамотрицательных
бактерий в перинатальном центре***

Исполнители: Аманова З.Ж.; Бисимбаева С.К.

Рис.1 Количество положительных проб, выделенных от пациентов, находившихся в отделениях ОРН и ОПН за 2021-2022 гг.






Рис.2 Этиологическая структура возбудителей верхних дыхательных путей в отделениях ОРН и ОПН в 2021 года




- Acinetobacter baumannii
- Escherichia coli
- Enterobacter aerogenes
- Pseudomonas aeruginosa




- Acinetobacter baumannii
- Escherichia coli
- Enterobacter aerogenes
- Pseudomonas aeruginosa

Рис.3 Этиологическая структура возбудителей верхних дыхательных путей в отделениях ОРН и ОПН 2022 года




■ Acinetobacter baumannii
 ■ Escherichia coli
■ Enterobacter aerogenes
 ■ Pseudomonas aeruginosa
■ Klebsiella pneumoniae



■ Acinetobacter baumannii
 ■ Escherichia coli
■ Enterobacter aerogenes
 ■ Pseudomonas aeruginosa
■ Klebsiella pneumoniae

Рис.4 Полирезистентность популяции грамотрицательных бактерий в отделениях ОРН и ОПН перинатального центра 2021-2022 гг.



Выводы:

- ▶ Проведенное исследование показало, что наибольшее число клинических изолятов, выделенных в отделениях патологии новорожденных и реанимации обладало полирезистентностью.
- ▶ Возрос процент резистентных грамотрицательных штаммов к карбапенемам в отделениях ОРН и ОПН перинатального центра.
- ▶ Совместная работа бактериологов, клинических фармакологов, эпидемиологов и клиницистов позволяет контролировать распространение резистентных штаммов бактерий.

► Благодарим за внимание